

# ГЕРПЕСВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТИ

---

***Профессор Алексей Алексеевич Хрянин***

*Новосибирский государственный медицинский университет МЗ РФ;  
РОО «Ассоциация акушеров-гинекологов и дерматовенерологов»;  
Эксперт Международного союза по борьбе с ИППП (IUSTI) в РФ*


*г. Санкт-Петербург, 29 апреля 2015 г.*

# Применение иммуномодуляторов в лечение герпес-вирусной инфекции



# Степень убедительности результатов исследования по изучению эффективности иммуномодуляторов с позиции доказательной медицины

## А. Доказательства убедительны



## С. Достаточных доказательств нет

ИП – Инозин Пранобекс;  
IFN – Интерфероны.

аял – англоязычная литература;  
рял – русскоязычная литература.

# Стандартный подход



Российское общество  
дерматовенерологов  
и косметологов

**ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯМИ,  
ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ,  
И УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ**

**КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

Москва

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ**

Москва - 2015

# Стандартный подход

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ И КОСМЕТОЛОГОВ

## ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ

Москва - 2015

*Профилактика инфицирования генитальным герпесом здорового полового партнера*

- валацикловир 500 мг перорально 1 раз в сутки в течение 12 месяцев при регулярных половых контактах (А) [18].

### Особые ситуации

*Лечение беременных*

Беременным с высокой частотой рецидивов (более 6 раз в год) и тем, у кого в I или во II триместре возник первичный клинический эпизод, рекомендован прием ацикловира в последние 4 недели беременности. Такая тактика снижает риск возникновения рецидива заболевания [19-24].

Кесарево сечение в качестве профилактики неонатального герпеса необходимо планировать всем беременным, у которых первичный эпизод возник после 34-й недели беременности, т.к. в этом случае существует значительный риск вирусывыделения во время родов. Если родоразрешение через естественные родовые пути неизбежно, необходимо проводить лечение у матери и ребенка.

- ацикловир 200 мг 5 раз в сутки перорально в течение 5-10 дней (А) [25] или

- ацикловир 400 мг 3 раза в сутки перорально в течение 5-10 дней (А) [25].

*Лечение герпеса в периоде новорожденности*

- ацикловир 20 мг на кг массы тела внутривенно 3 раза в сутки в течение 10-21 дней (А) [26].

### Требования к результатам лечения

- ускорение разрешения клинических проявлений;
- уменьшение частоты рецидивов генитального герпеса.


### Тактика при отсутствии эффекта от лечения

Рекомендуется назначение других препаратов или методик (курсовых) лечения.

При рецидивирующем течении заболевания рекомендовано применение интерферона системного действия - интерферона гамма 500000 МЕ 1 раз в сутки подкожно через день, на курс 5 инъекций (В) [28-30].

# Лечение хронического рецидивирующего герпеса, в том числе ацикловиррезистентного.

## Роль $\gamma$ - интерферона



Установлено, что несмотря на полиморфизм клинических проявлений герпес-инфекции, в этиологии первичного инфицирования, персистенции и рецидивирования лежит угнетение продукции интерферонов и снижение Т-клеточного иммунитета.

# Лечение хронического рецидивирующего герпеса, в том числе ацикловиррезистентного.

## Роль $\gamma$ интерферона

- Препарат Ингарон<sup>®</sup>, стимулируя выработку организмом собственного интерферона  $\gamma$ , обладает выраженным эффектом при лечении хронического рецидивирующего ацикловиррезистентного герпеса.
- Включение Ингарона<sup>®</sup> в терапию хронического рецидивирующего герпеса позволяет снизить частоту рецидивов в  $2,3 \pm 0,7$  раза.
- Проведенное исследование даёт основание считать Ингарон<sup>®</sup> препаратом выбора для лечения данной патологии.



# Ингарон®

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ НА  
ОСНОВЕ ИНТЕРФЕРОНА ГАММА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
РЕКОМБИНАНТНОГО

## Форма выпуска:

лиофилизат для приготовления раствора для  
внутримышечного и подкожного введения,  
флаконы по 100 000 МЕ, 500 000 МЕ;  
5 флаконов в упаковке



## Состав:

интерферон гамма –  
100 000 МЕ, 500 000 МЕ



Показания к применению:  
(500 000 МЕ через день, №5)

1 800 руб

5 000 руб

# Ингарон®

## Показания к применению:

- профилактика и лечение (в составе комплексной терапии) гриппа, в том числе «птичьего» происхождения;
- лечение хронического вирусного гепатита В и С, ВИЧ/СПИД инфекции и туберкулеза легких в комплексной терапии;
- профилактика инфекционных осложнений у больных с хронической гранулематозной болезнью;
- лечение онкологических заболеваний в комплексной терапии в качестве иммуномодулятора, в том числе в комбинации с химиотерапией;
- **лечение генитальной герпесвирусной инфекции и опоясывающего лишая (Herpes zoster) в монотерапии;**
- лечение урогенитального хламидиоза и хронического простатита в комплексной терапии;
- лечение папилломавирусной инфекции в комплексной терапии

Бесплатный курс повышения квалификации на портале дистанционного образования кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им. А.И. Евдокимова [www.do.koziz.ru](http://www.do.koziz.ru)



# Бесплатный курс повышения квалификации на портале дистанционного образования кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им. А.И. Евдокимова [www.do.koziz.ru](http://www.do.koziz.ru)



## Противоречия иммунотерапии

Нет доказательной базы клинической эффективности препаратов	Широкая пропаганда средствами массовой информации
Определение клинически эффективных доз препаратов	Частота назначений: <ul style="list-style-type: none"><li>• терапевты – 29%</li><li>• педиатры – 14%</li><li>• хирурги – 12%</li><li>• гинекологи – 10%</li><li>• врачи др. спец. – 4%</li></ul>
Сравнительный анализ однонаправленных иммуномодуляторов	